

### 1. DENOMINACIÓN DEL MEDICAMENTO

OMECAN

### 2. COMPOSICIÓN

Cada mL contiene:

Omeprazol..... 5 mg

Vehículo cbp..... 1 mL

### 3. FORMA FARMACÉUTICA

Suspensión oral.

### 4. INDICACIONES TERAPÉUTICAS

OMECAN está indicado para el control y tratamiento de úlceras gastroduodenales y esofagitis, producidas por infecciones bacterianas, virales, tóxicas o alimenticias y donde se encuentre involucrado el *Helicobacter pylori*.

### 5. ESPECIES DE DESTINO

Caninos y felinos domésticos.

### 6. DOSIS

1 mL de OMECAN por cada 5 Kg de peso corporal (equivalente a 1 mg de omeprazol por cada Kg de peso corporal), cada 12 horas.

### 7. VÍA DE ADMINISTRACIÓN

Oral.

### 8. ADVERTENCIAS

- No se administre en animales deshidratados.
- No se deje al alcance de los niños y de otros animales domésticos.
- Producto de uso exclusivo en medicina veterinaria.
- Almacénese en un lugar fresco y seco protegido de la luz.

### 9. PROPIEDADES FARMACOLÓGICAS

Inhibidor de la secreción ácida gástrica que promueve la curación de las úlceras en estómago, duodeno y esófago. En el medio ácido estomacal, el omeprazol es protonizado y rápidamente se forman dos productos, el ácido sulfínico y una

sulfenamida, los cuales se unen de manera irreversible a la H<sup>+</sup>,K<sup>+</sup>-ATPasa (bomba de protones), enzima localizada en la superficie secretora de las células parietales. A través de esta acción, inhibe el transporte final de iones hidrógeno hacia la luz gástrica.

El omeprazol se absorbe rápido y por completo después de administración oral, se une extensamente a las proteínas plasmáticas (95%) y alcanza concentraciones altas en diversos tejidos, en especial en las células parietales de la mucosa gástrica. Se metaboliza en gran parte en la orina y en las heces. Su vida media plasmática es de 30 a 60 min.

### 10. CONTRAINDICACIONES

- La administración de OMECAN y claritromicina conjuntamente, puede provocar que las concentraciones plasmáticas de ambos fármacos aumenten.
- La administración conjunta con sucralfato produce una disminución de la absorción del omeprazol.
- La administración de OMECAN y benzodiazepinas conjuntamente puede prolongar los efectos de la benzodiazepina en el sistema nervioso central.

### 11. PERIODO DE VALIDEZ

4 años.

### 12. NATURALEZA Y CONTENIDO DEL ENVASE

Frasco de polietileno de alta densidad blanco con tapa inviolable y jeringa dosificadora plástica de 5 mL.

Contenido del envase: 50 mL.

### 13. TITULAR DE LA AUTORIZACIÓN DE COMERCIALIZACIÓN

SABRA PHARMA S.A. de C.V. Cerrada Guadalupe Victoria Lote 3, Col. Tecamachalco, La Paz, Estado de México, C.P. 56500.

### 14. INFORMACIÓN FINAL

**DISPENSACIÓN:** Con prescripción veterinaria.

Fecha de la autorización/renovación: 21-Ene-19

Fecha de la última revisión del texto: 21-Ene-19