

1. DENOMINACIÓN DEL MEDICAMENTO

SULTRICAN

2. COMPOSICIÓN

Cada mL contiene:	
Trimetoprim	8 mg
Sulfametoxazol	40 mg
Neomicina	50 mg
Pectina	8 mg
Caolín	80 mg
Vehículo cbp	1 mL

3. FORMA FARMACÉUTICA

Suspensión oral.

4. INDICACIONES TERAPÉUTICAS

SULTRICAN Combinación sinérgica antimicrobiana de Trimetoprim+Sulfametoxazol + Neomicina de amplio espectro. indicada en: Perros: Síndrome de diarrea hemorrágica causada por C. perfringens, Infecciones del tracto urinario y próstata causadas por E.coli, Streptococcus spp., infecciones en el tracto respiratorio (neumonías bacterianas) causadas por Bordetella bronchiséptica, Haemophillus sp y Pasteurella multocida. Infecciones en la piel (piodermas, abscesos y heridas infectadas) causadas por Staphylococcus aureus, Streptococcus sp., y E. coli. En perros y gatos: indicada en el tratamiento de: Otitits causadas por Streptococcus aureus, E. coli y Staphylococcus sp., Enteropatías de origen infecciosos causadas por Shigella sp., y E. coli, Infecciones oculares (conjuntivas, blefaritis, sepsis neonata) causadas por E. coli y Staphylococcus sp. SULTRICAN, está adicionado con caolín y pectina, que forman una película protectora de la mucosa intestinal.

5. ESPECIES DE DESTINO

Caninos felinos domésticos.

6. DOSIS

Caninos y felinos: 1 ml de SULTRICAN por cada 3 kg de peso corporal; equivalente a 2.4 mg de Trimetoprim, 12 mg de Sulfametoxazol y 15 mg de Neomicina por kg de peso corporal, cada 12 horas, hasta que desaparezcan los síntomas, de 2 a 5 días; posterior a este tiempo, la dosificación y duración del tratamiento hasta 7 días, será revaluando el cuadro clínico y bajo responsabilidad y vigilancia del médico veterinario.

7. VIA DE ADMINISTRACIÓN

Oral.

8. ADVERTENCIAS

- Durante el tratamiento se deberá administrar suficiente agua de bebida.
- No administrar a animales con sensibilidad conocida a las sulfamidas.
- No exceda la dosis recomendada.
- Mantenga este producto en un lugar fresco, seco y protegido de la luz.
- No se deje al alcance de los niños y animales domésticos.
- Para uso exclusivamente veterinario.

9. PROPIEDADES FARMACOLÓGICAS

El Sulfametoxazol y Trimetoprim se absorben rápidamente por vía oral alcanzando su máxima concentración en sangre en 2 horas, se distribuyen a la mayoría de los tejidos incluyendo sistema nervioso central y fluidos corporales, una fracción de sulfametoxazol es metabolizada en hígado por medio de acetilación y finalmente ambos compuestos y sus metabolitos son eliminados por filtración glomerular y secreción tubular activa

La Neomicina es un antibiótico perteneciente a la familia de los aminoglucósidos. Tiene actividad contra gérmenes Gram Negativos y algunos Gram Positivos. Posee un efecto local cuando es administrada vía oral debido a su nula absorción, por lo que se elimina completamente a través de las heces. La combinación Caolín-Pectina tiene un efecto protector, son compuestos no absorbibles que recubren la mucosa gastrointestinal y previenen la irritación y erosión por sustancias potencialmente dañinas. Por su actividad demulcente y adsorbente se utiliza para el tratamiento inespecífico de la diarrea. No se absorben después de su administración oral.

10. CONTRAINDICACIONES

No se deberá a animales que presenten daño renal y/o hepático. En dosis altas se puede presentar constipación. No se administre **SULTRICAN** en animales en gestación ni en lactación.

11. PERIODO DE VALIDEZ

4 años.

HEALTH

12. NATURALEZA Y CONTENIDO DEL ENVASE

Frasco de polietileno de alta densidad blanco con tapa inviolable y jeringa dosificadora plástica de 5 mL. Contenido del envase: 50 mL.

13. TITULAR DE LA AUTORIZACIÓN DE COMERCIALIZACIÓN

SABRA PHARMA S.A. de C.V. Cerrada Guadalupe Victoria Lote 3, Col. Tecamachalco, La Paz, Estado de México, C.P. 56500.

14. INFORMACIÓN FINAL

DISPENSACIÓN: Con prescripción veterinaria. Fecha de la autorización/renovación: 06-Ago-19 Fecha de la última revisión del texto: 06-Ago-19