

1. DENOMINACIÓN DEL MEDICAMENTO

VEREDCAN

2. COMPOSICIÓN

Cada mL contiene:

Subsalicilato de Bismuto..... 17.5 mg

Vehículo cbp..... 1 mL

3. FORMA FARMACÉUTICA

Suspensión oral.

4. INDICACIONES TERAPÉUTICAS

VEREDCAN es un antidiarreico, protector de mucosa gastrointestinal, antisecretor, adsorbente de toxinas producidas por *E. coli*, antiflatulento, indicado en el tratamiento inespecífico de gastroenteritis y diarreas en caninos y felinos.

5. ESPECIES DE DESTINO

Caninos y felinos domésticos.

6. DOSIS

PERROS. Para diarrea: 1 mL de VEREDCAN por cada 5 Kg de peso corporal (equivalente a 3.5 mg de subsalicilato de bismuto por Kg de peso corporal) 3 veces al día; no se administre por más de 5 días. **Para la eliminación de infecciones gastrointestinales por *Helicobacter pylori*:** 0.22 mL de VEREDCAN por cada Kg de peso corporal (el equivalente a 3.85 mg de subsalicilato de bismuto por Kg de peso corporal) cada 4 o 6 horas durante 3 semanas. **Como agente gastroprotector:** 2 mL de VEREDCAN por cada Kg de peso corporal (el equivalente a 35 mg de subsalicilato de bismuto por Kg de peso corporal) cada 6 a 8 horas.

GATOS. Para diarrea: 0.25 mL por cada Kg de peso corporal (el equivalente a 4.375 mg de subsalicilato de bismuto por Kg de peso corporal) cada 4 o 6 horas. **Para la diarrea en cachorros y gatos pequeños:** 1-2 mL de VEREDCAN (el equivalente a 17.5-35 mg de subsalicilato de bismuto) de 3 a 4 veces al día. Para la eliminación de las infecciones gastrointestinales por *Helicobacter pylori*: 0.22 mL por Kg de peso corporal (el equivalente a 3.85 mg de subsalicilato de bismuto por Kg de peso corporal) cada 4 o 6 horas.

HURONES. Para la eliminación de las infecciones gastrointestinales por *Helicobacter pylori*: 1 mL de VEREDCAN (el equivalente a 17.5 mg por Kg de peso corporal) vía oral cada 8 horas, durante 21 días.

7. VÍA DE ADMINISTRACIÓN

Oral.

8. ADVERTENCIAS

- No se deje al alcance de los niños y de otros animales domésticos.
- Producto de uso exclusivo en medicina veterinaria.
- Almacénese en un lugar fresco y seco protegido de la luz.

9. PROPIEDADES FARMACOLÓGICAS

Sal insoluble de bismuto trivalente y ácido salicílico con propiedades adsorbentes y antidiarreicas. Este efecto depende de su capacidad para aumentar la absorción intestinal de líquidos y electrolitos y, cuando se hidroliza a ácido acetilsalicílico, de su acción para inhibir la síntesis de las prostaglandinas que causan la inflamación e hipermotilidad intestinal. El subsalicilato de bismuto y sus productos intestinales, oxiclورو de bismuto e hidróxido de bismuto, tienen cierta acción bactericida. El subsalicilato de bismuto no se absorbe por la mucosa gastrointestinal, o lo hace en cantidad mínima. Sin embargo, una porción considerable se hidroliza en el estómago, donde se forman oxiclورو de bismuto y ácido salicílico, que sí se absorben. El salicilato absorbido se elimina por vía renal. En el intestino se forman otras sales insolubles de bismuto que oscurecen las heces.

10. CONTRAINDICACIONES

Los gatos son sensibles a los salicilatos y no deben de recibir dosis altas con frecuencia. Contraindicado en pacientes con hipersensibilidad a los componentes de la formulación. Puede disminuir la absorción intestinal de tetraciclinas y el efecto uricosúrico de la sulfpirazona. La administración crónica aumenta el efecto de los anticoagulantes fibrinolíticos.

11. PERIODO DE VALIDEZ

4 años.

12. NATURALEZA Y CONTENIDO DEL ENVASE

Frasco de polietileno de alta densidad blanco con tapa inviolable y jeringa dosificadora plástica de 5 mL. Contenido del envase: 50 mL.

13. TITULAR DE LA AUTORIZACIÓN DE COMERCIALIZACIÓN

SABRA PHARMA S.A. de C.V. Cerrada Guadalupe Victoria Lote 3, Col. Tecamachalco, La Paz, Estado de México, C.P. 56500.

14. INFORMACIÓN FINAL

DISPENSACIÓN: Con prescripción veterinaria.

Fecha de la autorización/renovación: 14-Ene-19

Fecha de la última revisión del texto: 14-Ene-19