

1. DENOMINACIÓN DEL MEDICAMENTO

CARPROFECAN 25

2. COMPOSICIÓN

Cada tableta contiene:

Carprofeno.....25 mg

Excipiente c.b.p.....1 tableta

3. FORMA FARMACÉUTICA

Tableta.

4. INDICACIONES TERAPÉUTICAS

CARPROFECAN 25 es un antiinflamatorio no esterooidal indicado para tratar el dolor post-operatorio y la inflamación después de cirugías de tejidos blandos y ortopédicas en perros. También reduce la inflamación crónica de enfermedades degenerativas de las articulaciones como la osteoartritis.

CARPROFECAN 25 también tiene propiedades antipiréticas y analgésicas.

5. ESPECIES DE DESTINO

Caninos.

6. DOSIS

Dosis inicial: 1 tableta por cada 12.5 Kg de peso corporal cada 12 horas, equivalente a 2 mg de Carprofeno por Kg de peso corporal (4 mg de carprofeno por Kg de peso corporal al día).

Dosis de mantenimiento: 1 tableta por cada 12.5 Kg de peso corporal cada 24 horas (equivalente a 2 mg de carprofeno por Kg de peso corporal al día).

7. VIA DE ADMINISTRACIÓN

Oral.

8. ADVERTENCIAS

- No usar en gatos.
- No se deje al alcance de los niños.
- Consérvese a temperatura ambiente, en un lugar seco y protegido de la luz.
- Producto de uso exclusivo en medicina veterinaria.

9. PROPIEDADES FARMACOLÓGICAS

El Carprofeno es un antiinflamatorio no esterooidal, inhibe del enzima ciclooxygenasa de la cascada del ácido araquidónico. Sin embargo, la inhibición de la síntesis de prostaglandina por carprofeno es pequeña en relación a su potencia antiinflamatoria y analgésica.

Después de la administración por vía oral, el carprofeno es bien absorbido en perros. Tras la administración de las tabletas en perros, se alcanzó una Cmax (concentración plasmática

máxima) media de 6,1 mg/l y de 3,6 mg/l en aproximadamente 1 hora para Carprofeno R(-) y Carprofeno S(+), respectivamente. Para ambos enantiómeros, la semivida media fue de aproximadamente de 9 horas. El efecto analgésico de cada dosis persiste durante al menos 12 horas. El carprofeno se metaboliza en el hígado mediante conjugación y oxidación. La excreción del conjugado glucurónico tras la excreción biliar es principalmente fecal.

10. CONTRAINDICACIONES

- No administrar en pacientes con hipersensibilidad al carprofeno.
- No administrar junto con otros AINE dentro de las 24 horas de diferencia o glucocorticoides.
- No administrar en pacientes deshidratados, hipovolémicos, hipotensos, con insuficiencia renal aguda, insuficiencia hepática o con enfermedades gastrointestinales.
- No administrar en animales gestantes ni en menores de 6 semanas de edad.

11. PERIODO DE VALIDEZ

2 años.

12. NATURALEZA Y CONTENIDO DEL ENVASE

Caja con encefalanado de celopolial.

Contenido del envase: 30 tabletas.

13. TITULAR DE LA AUTORIZACIÓN DE COMERCIALIZACIÓN

SABRA PHARMA S.A. de C.V. Cerrada Guadalupe Victoria Lote 3, Col. Tecamachalco, La Paz, Estado de México, C.P. 56500.