

1. DENOMINACION DEL MEDICAMENTO

CONDROCAN

2. COMPOSICIÓN

Cada tableta contiene:

Condroitina.....	130 mg
Colágeno.....	130 mg
Glucosamina.....	110 mg
Meloxicam.....	1 mg
Excipiente c.b.p.....	1 tableta

3. FORMA FARMACÉUTICA

Tabletas.

4. INDICACIONES TERAPÉUTICAS

CONDROCAN, es coadyuvante en el tratamiento de enfermedades degenerativas articulares y de osteoartritis, tiene propiedades regenerativas de cartílago y promueve elasticidad. CONDROCAN es útil en animales con desgaste articular debido a ejercicio elevado o edad avanzada.

CONDROCAN está adicionado con meloxicam, que reduce la inflamación y el dolor articular.

5. ESPECIES DE DESTINO

Caninos domésticos.

6. DOSIS

Administrar 1 tableta por cada 10 Kg de peso corporal al día (equivalente a 13 mg/Kg de condroitina, 13 mg/Kg de colágeno, 11 mg/Kg de glucosamina y 0.1 mg/Kg de meloxicam). La duración del tratamiento y dosificación puede variar de acuerdo a las indicaciones del médico veterinario.

7. VIA DE ADMINISTRACIÓN

Oral.

8. ADVERTENCIAS

- No se deje al alcance de los niños.
- Consérvese a temperatura ambiente, en un lugar seco y protegido de la luz.
- Producto de uso exclusivo en medicina veterinaria.

9. PROPIEDADES FARMACOLÓGICAS

El efecto condroprotector y reparador de la glucosamina, aunado a su acción sintomática, modifica la evolución de la osteoartrosis, que, sumado a la acción antiinflamatoria y analgésica del meloxicam, alivia el dolor, tanto en reposo como durante el movimiento de forma significativa, mejorando la movilidad a corto y mediano plazo. Ofrece una acción sintomática rápida.

Por su parte, el efecto terapéutico de la condroitina, se basa en las siguientes propiedades: actividad antiinflamatoria frente a células inflamatorias, estimulación de la síntesis de proteoglicanos endógenos y ácido hialurónico.

El colágeno ha demostrado tener un efecto mayor y más a corto plazo sobre la regeneración articular y el dolor.

10. CONTRAINDICACIONES

- No se administre en animales con hipersensibilidad a los componentes de la fórmula.
- No administrar junto con otros AINE.
- No administrar en animales menores a las 6 semanas de edad.

11. PERIODO DE VALIDEZ

2 años.

12. NATURALEZA Y CONTENIDO DEL ENVASE

Frasco de polietileno blanco con tapa children blanca. Contenido del envase: 30 tabletas.

13. TITULAR DE LA AUTORIZACION DE COMERCIALIZACIÓN

SABRA PHARMA S.A. de C.V. Cerrada Guadalupe Victoria Lote 3, Col. Tecamachalco, La Paz, Estado de México, C.P. 56500.